ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/ ๒๕๐๔



กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั่วโลก จำนวน ๖๓,๑๑๗ ราย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๖ ประเทศ มีพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ในแถบทวีปยุโรป และมีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๐ ราย โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฝีดาษวานร (Monkeypox) จำนวน ๘ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการแยกกักรักษาในโรงพยาบาล

ในการนี้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ที่อาจเกิดขึ้นในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เรือนจำทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) และกำชับการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายโรค (Standard Precautions) อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ กรณีพบผู้ต้องขังสงสัยติดเชื้อโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ให้ดำเนินการแยกกักโรคเพื่อสังเกตอาการต่อ และดำเนินการตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์โรคเบื้องต้นให้กรมราชทัณฑ์ โดยกองบริการทางการแพทย์ทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเรือนจำถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย ชัยวัฒน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / เรือนจำอำเภอพล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / เรือนจำจังหวัดชุมพร / เรือนจำอำเภอหลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / เรือนจำอำเภอเทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนจำอำเภอฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / เรือนจำจังหวัดตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / เรือนจำจังหวัดตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / เรือนจำอำเภอแม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / เรือนจำจังหวัดนครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / เรือนจำอำเภอทุ่งสง / เรือนจำอำเภอปากพนัง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / เรือนจำจังหวัดน่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำอำเภอนางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำอำเภอธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / เรือนจำจังหวัดพะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / เรือนจำจังหวัดพังงา / เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / เรือนจำจังหวัดแพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง (ต่อ)

๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / เรือนจำอำเภอเบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / เรือนจำจังหวัดยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / เรือนจำจังหวัดระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / เรือนจำจังหวัดเลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / เรือนจำจังหวัดสกลนคร / เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / เรือนจำจังหวัดสงขลา / เรือนจำอำเภอนาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / เรือนจำจังหวัดสตูล
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / เรือนจำอำเภอไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ



ส่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๓ ภายใน ๑๐๗ ๑๐๘

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/ ๒๖๐๔ **วันที่** ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)

เรียน

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั่วโลก จำนวน ๖๓,๑๑๗ ราย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๖ ประเทศ มีพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ในแถบทวีปยุโรป และมีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๐ ราย โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฝีดาษวานร (Monkeypox) จำนวน ๘ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการแยกกักรักษาในโรงพยาบาล

ในการนี้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ที่อาจเกิดขึ้นในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เรือนจำทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) และกำชับการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายโรค (Standard Precautions) อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ กรณีพบผู้ต้องขังสงสัยติดเชื้อโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ให้ดำเนินการแยกกักโรคเพื่อสังเกตอาการต่อ และดำเนินการตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์โรคเบื้องต้นให้กรมราชทัณฑ์ โดยกองบริการทางการแพทย์ทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายธวัชชัย ชัยวัฒน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๖ แห่ง

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๖ แห่ง (ต่อ)

๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/ ๖๕๐๑

ถึง เรือนจำจังหวัด/เรือนจำอำเภอ

กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/ ๖๕๐๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป

กรมราชทัณฑ์
๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

เรือนจำจังหวัด/เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง

๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท / จังหวัดชัยนาท
๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร / จังหวัดชุมพร
๘. เรือนจำจังหวัดตรัง / จังหวัดตรัง
๙. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๑๐. เรือนจำจังหวัดนครนายก / จังหวัดนครนายก
๑๑. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / จังหวัดนนทบุรี
๑๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส / จังหวัดนราธิวาส
๑๓. เรือนจำจังหวัดน่าน / จังหวัดน่าน
๑๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๕. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / จังหวัดปทุมธานี
๑๗. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. เรือนจำจังหวัดพะเยา / จังหวัดพะเยา
๒๐. เรือนจำจังหวัดพังงา / จังหวัดพังงา
๒๑. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. เรือนจำจังหวัดพิจิตร / จังหวัดพิจิตร
๒๓. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / จังหวัดพิษณุโลก
๒๔. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. เรือนจำจังหวัดแพร่ / จังหวัดแพร่
๒๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๒๗. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / จังหวัดมหาสารคาม
๒๘. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๒๙. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๓๑. เรือนจำจังหวัดระนอง / จังหวัดระนอง
๓๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๓. เรือนจำจังหวัดลำพูน / จังหวัดลำพูน
๓๔. เรือนจำจังหวัดเลย / จังหวัดเลย
๓๕. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖. เรือนจำจังหวัดสกลนคร / จังหวัดสกลนคร
๓๗. เรือนจำจังหวัดสงขลา / จังหวัดสงขลา
๓๘. เรือนจำจังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๓๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / จังหวัดสระแก้ว
๔๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๔๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จังหวัดสิงห์บุรี
๔๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
๔๔. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๔๖. เรือนจำจังห่วัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / จังหวัดอ่างทอง
๔๘. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๙. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดอุทัยธานี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / จังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๕๒. เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ / จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / จังหวัดลพบุรี
๕๕. เรือนจำอำเภอไชยา / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๖. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า / จังหวัดพังงา
๕๗. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ / จังหวัดกาญจนบุรี
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. เรือนจำอำเภอเทิง / จังหวัดเชียงราย
๖๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / จังหวัดปทุมธานี
๖๑. เรือนจำอำเภอนางรอง / จังหวัดบุรีรัมย์
๖๒. เรือนจำอำเภอนาทวี / จังหวัดสงขลา
๖๓. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / จังหวัดนครราชสีมา
๖๔. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา
๖๕. เรือนจำอำเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๖. เรือนจำอำเภอฝาง / จังหวัดเชียงใหม่
๖๗. เรือนจำอำเภอพล / จังหวัดขอนแก่น
๖๘. เรือนจำอำเภอภูเขียว / จังหวัดชัยภูมิ
๖๙. เรือนจำอำเภอแม่สอด / จังหวัดตาก
๗๐. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๑. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / จังหวัดสุรินทร์
๗๒. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก / จังหวัดสุโขทัย
๗๓. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / จังหวัดสกลนคร
๗๔. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / จังหวัดนครราชสีมา
๗๕. เรือนจำอำเภอหล่มสัก / จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๖. เรือนจำอำเภอหลังสวน / จังหวัดชุมพร

แนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)

ฉบับที่ ๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) เกิดจากเชื้อ monkeypox virus ในกลุ่ม Orthopoxvirus genus อาการไม่รุนแรง สามารถหายเองได้ แต่จะมีอาการรุนแรงในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและเด็กเล็ก อัตราการตายต่ำกว่าร้อยละ ๕

อาการและอาการแสดง

ระยะฟักตัว ๗ – ๒๑ วัน เริ่มด้วยอาการไข้และตุ่มแดงภายหลังรับเชื้อประมาณ ๕ - ๗ วัน จากนั้นเปลี่ยนเป็นตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง และแห้งตกสะเก็ด รวมระยะเวลาประมาณ ๒ – ๔ สัปดาห์

การแพร่กระจายเชื้อและการติดต่อ

๑) สัมผัสผื่นในระยะแพร่เชื้อ หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยยืนยันโดยตรง (contact transmission)

๒) ติดต่อทางละอองฝอยของผู้ป่วยยืนยัน (droplet transmission)

คำนิยามผู้ป่วย (กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๑. ผู้ป่วยสงสัย (suspected case)

๑) มีอาการ ไข้ ร่วมกับ อาการอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองโต

๒) มีผื่นหรือตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด กระจายตามใบหน้า ศีรษะ ลำตัว ฝ่ามือฝ่าเท้า อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก โดยเป็นผื่นระยะเดียวกันพร้อมกันทั้งตัว หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติ **ร่วมกับ** มีประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายในเวลา ๒๑ วันที่ผ่านมา หนึ่งข้อ ดังต่อไปนี้

๑) มีประวัติการสัมผัสที่ทำให้แพทย์วินิจฉัยสงสัยโรคฝีดาษวานร

๒) มีประวัติเดินทางจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร หรือมีอาชีพที่ต้องสัมผัสคลุกคลีกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

๓) มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มาจากถิ่นระบาด เช่น ทวีปแอฟริกา

๒. ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed case)

ผู้ป่วยที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ **ยืนยัน พบเชื้อ/สารพันธุกรรมmonkeypox virus (MPXV)** อย่างน้อย ๒ ห้องปฏิบัติการ จากเทคนิคการตรวจข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑) วิธี Real-time PCR จำเพาะต่อ MPXV

๒) วิธี DNA sequencing เพื่อหายีนที่จำเพาะต่อ MPXV

๓) วิธีเพาะเชื้อไวรัส (viral isolation)

แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา ผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร (suspected case)

๑. ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

๑) บุคลากรทางการแพทย์สวมชุด PPE ตามความเสี่ยงของกิจกรรม

๒) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓) รับ admit ในห้องแยกโรคเดี่ยว (single isolation room) จนกว่าจะทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อทราบผลการตรวจหาเชื้อ monkeypox virus ให้ดำเนินการดังนี้


ไม่พบเชื้อ : ให้การรักษาตามสาเหตุของโรค จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และให้สังเกตอาการต่อ ๒๑ วัน หากมีอาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต และผื่น ให้ไปพบแพทย์

พบเชื้อ : รับ admit ในห้องแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อทุกราย

๒. ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือคลินิก


๑) พื้นที่ กทม. แจ้งทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานอนามัย

๒) พื้นที่ส่วนภูมิภาค แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตามสอบสวนโรค และประสานโรงพยาบาลในพื้นที่รับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาล



<u>การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ</u>

การเก็บสิ่งส่งตรวจ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ ๓ (BSL3) ขึ้นไป ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการในเครือมหาวิทยาลัย



การแปลผล

กรณีผู้ป่วยสงสัย และผู้สัมผัส

ผลบวก หมายถึง ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ให้ผลพบเชื้อผิดพลาดจาก อย่างน้อย 2 ห้องปฏิบัติการ ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทย์ฯ หรือ โรงพยาบาลบำราศให้ผลพบเชื้อ ขอให้มีการส่งตรวจยืนยันอีกครั้ง ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้ตัวอย่างเดิม

ผลลบ หมายถึง ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ให้ผลไม่พบเชื้อผิดพลาดจาก อย่างน้อย 2 ห้องปฏิบัติการ

หากห้องปฏิบัติการแห่งใดแห่งหนึ่งให้ผลลบ ในขณะที่อีกแห่งให้ผลบวก ขอให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจใหม่อีกครั้ง

<u>การตรวจประเมินผู้ป่วยสงสัย ณ จุดคัดกรอง</u>

๑. รักษาระยะห่างประมาณ ๑ เมตร ขึ้นไป และมีการระบายอากาศที่ดี

๒. ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีผ้าหรือวัสดุอื่นปิดผื่นและตุ่มรอยโรคให้มิดชิด

๓. ถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะเป็น Disseminated herpes zoster/Chicken pox/Disseminated herpes simplex ให้พิจารณาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปพักรอการตรวจในห้องแยกเดี่ยว หรือ Modified AIIR หรือ AIIR

<u>การตรวจร่างกายผู้ป่วย</u>

ระยะใกล้ชิด ผู้ตรวจและผู้ช่วยตรวจ ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (personal protective equipment, PPE) ได้แก่ หน้ากากชนิด N-95 face shield หมวกคลุมผมชนิดพลาสติก isolation gown ถุงมือ รองเท้าชนิดที่สามารถทำความสะอาดได้ในภายหลัง ไม่ต้องสวมพลาสติกคลุมรองเท้า

ภายหลังการตรวจร่างกายเสร็จ ให้ถอด PPE ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่ หรือ alcohol hand rub

ระยะ<u>ไม่</u>ใกล้ชิด ใส่เฉพาะหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของ COVID-19

แนวทางการบริหารจัดการ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคฝีดาษวานร (confirmed case)

แนะนำให้ admit ทุกรายในโรงพยาบาล เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อและติดตามอาการ

๑. รักษาตามอาการ ดูแลไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

๒. รักษาจำเพาะ ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง การใช้ยาต้านไวรัส คือ **Tecovirimat (TPOXX)** ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแทรกของไวรัสเข้าไปในเซลล์ มีทั้งชนิดรับประทาน และให้หลอดเลือดดำ โดยมีรายงานการใช้ยาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศกลุ่มยุโรป

ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรครุนแรง

๑. ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

๑) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (CD๔ <๒๐๐ cells/cumm.)

๒) มะเร็งเม็ดเลือด ได้แก่ leukemia, lymphoma และโรคมะเร็งอวัยวะต่าง ๆ

๓) ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกมาภายใน ๒ ปี หรือตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป แต่มีภาวะ graft-versus-host disease หรือโรคเดิมกำเริบ

๔) ได้รับการรักษาด้วย alkylating agents, antimetabolites, radiation, tumor necrosis factor inhibitors, high-dose corticosteroids

๕) โรค autoimmune disease โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๘ ปี

๒. หญิงตั้งครรภ์หรือระหว่างให้นมบุตร

๓. ผู้ที่มีประวัติเป็น Atopic dermatitis หรือกำลังมีโรคผิวหนังชนิด exfoliative อยู่

๔. ผู้ป่วยที่มีรอยโรคในตำแหน่งที่อาจเป็นอันตราย เช่น ตา ปาก อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก

๕. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง/ภาวะแทรกซ้อนจากสาเหตุอื่นอยู่แล้ว

การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ

ใช้หลักการป้องกันมาตรฐาน (standard precautions) โดยเน้นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส (contact precautions) และ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากละอองฝอย (droplet precautions) เป็นหลัก

ห้องผู้ป่วย	อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย	การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
๑) ให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกเดี่ยว (single isolation room) ประตูปิดสนิท ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องที่มีความดันลบ ๒) แยกอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเฉพาะรายบุคคล ๓) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้มีการฟุ้งกระจายจากสะเก็ดของรอยโรค	๑) ผู้ป่วย : สวมหน้ากากอนามัยและใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมรอยโรคมิดชิด ๒) บุคลากร : พิจารณาตามกิจกรรมและความเสี่ยงของหัตถการ	๑) ผู้ป่วย : สวมหน้ากากอนามัยและใส่เสื้อผ้าที่ปกคลุมรอยโรคมิดชิด ๒) บุคลากร : พิจารณาตามกิจกรรมและความเสี่ยงของหัตถการ ** ทำเมื่อจำเป็น และให้แจ้งหน่วยงานปลายทางทราบ **

การจำหน่ายผู้ป่วย

ผู้ป่วยจะถูกแยกกักนานประมาณ ๒๑ วัน หรือพ้นระยะแพร่เชื้อ คือ รอยโรคตกสะเก็ด สะเก็ดหลุด มีผิวหนังปกติ

การใส่ PPE ตามประเภทระดับความเสี่ยงของกิจกรรม

กิจกรรม	หมวก	Goggle/ face shield	Surgical mask	N95	ถุงมือ	เสื้อ gown	ชุด cover all	รองเท้าบูท
บุคลากรในรถส่งต่อผู้ป่วย พนักงานขับรถ ambulance ที่ห้องโดยสารไม่ได้แยกส่วน	+	+	-	+	+	-	+	+
การตรวจร่างกายผู้ป่วยในระยะใกล้ชิด	+	+	-	+	+	+	-	+
การคัดกรองทั่วไป อยู่ในระยะห่างจากผู้ป่วย 1 เมตรขึ้นไป	-	+	+	-	-	-	-	-
การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ	+	+	-	+	+	+	-	+
การทำหัตถการที่สารคัดหลั่งมีโอกาสฟุ้งกระจาย (aerosol generating procedure)	+	+	-	+	+	+	+ ใช้ cover all	+
การดูแลผู้ป่วยในห้องพักของผู้ป่วย	+	+	-	+	+	-	+	+
พนักงานเปล	+	+	+	-	+	+	-	-
การทำความสะอาดห้องผู้ป่วย	+	+	-	+	+ (ถุงมือแม่บ้านอย่างหนา)	-	+	+
พนักงานขับรถ Ambulance ที่ห้องโดยสารเป็นแบบแยกส่วน	-	-	+	-	-	-	-	-
การนำผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยเข้าเครื่องซักผ้า, การเก็บมูลฝอยลงถุงขยะติดเชื้อ	+	+	-	+	+ (ถุงมือแม่บ้านอย่างหนา)	-	+	+

Monkeypox 1

แบบรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคฝีดาษวานร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

(หมายเลขตัวอย่าง.....)

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย.....เพศ ○ชาย ○หญิง อายุ.....ปี.....เดือน

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่ขณะป่วยเลขที่.....หมู่.....ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

วันที่เริ่มป่วย.....วันที่รับการรักษา.....วันที่สิ้นสุดการรักษา.....

รับการรักษาที่โรงพยาบาล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

อุณหภูมิแรกรับ.....องศาเซลเซียส

ประวัติการรับวัคซีนฝีดาษ

❑ไม่เคย ❑ เคย เมื่อ.....ปี.....เดือน.....พ.ศ.....

อาการและการตรวจพบ

❑ มีไข้ ❑ เจ็บคอ ❑ มีน้ำมูก ❑ไอ ❑ตาแดง ❑ปวดศีรษะ ❑ ปวดกล้ามเนื้อ
❑ปวดท้อง ❑คัน

❑ผื่น/ตุ่มน้ำ/ตุ่มหนอง/สะเก็ดแผล ที่บริเวณ.....ลักษณะ.....

❑แผลที่บริเวณ.....ลักษณะ.....

❑ต่อมน้ำเหลืองทั่วไปโตระบุตำแหน่ง.....

❑อาการทางระบบอวัยวะสืบพันธุ์ระบุ.....

❑อาการอื่นๆ ระบุ.....

การวินิจฉัยขั้นต้น .....

ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง

❑ท่านได้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ระบุประเทศต้นทาง.....

วันที่ออกเดินทาง.....วันที่มาถึงประเทศไทย.....เที่ยวบิน.....

❑เป็นกลุ่ม LGBT โปรดระบุ (L = เลสเบี้ยน, G = เกย์, B = ไบเซ็คชวล, T = ทรานเจนเดอร์, อื่นๆ)

❑เคยสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา

❑ เคยสัมผัสกับผู้ที่มีผื่นเป็นลักษณะตุ่มน้ำใส ต่อมาเป็นหนอง และตกสะเก็ด ร่วมกับอาการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ปวดศีรษะ มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดเมื่อยตัว ปวดหลัง อ่อนเพลีย ต่อมน้ำเหลืองโต ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา ระบุผู้สัมผัส.....

❑ เคยสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก ลิง กอริล่า เป็นต้น ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา


ตัวอย่างส่งตรวจ

❑ Lesion fluid, roof หรือ biopsy	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บ.....
❑ เลือด EDTA	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บ.....
❑ Clot blood	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บ.....
❑ Nasopharyngeal swab	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บ.....
❑ Tonsillar tissue swab	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บ.....
❑ จากที่อื่น ๆ ระบุ	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บ.....

✂----------

ชื่อและที่อยู่ของผู้นำส่งตัวอย่าง	ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องทราบผล
ชื่อ.....	ชื่อ.....
ที่อยู่.....	ที่อยู่.....
.....	.....
โทรศัพท์.....	โทรศัพท์.....
โทรสาร.....	โทรสาร.....

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)



Checklist ✓

ฝีดาษวานร (Monkeypox) สำหรับประชาชน

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

หากมีประวัติเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานร ดังนี้



มีเพศสัมพันธ์



สัมผัส ตุ่ม แผล ผื่น สารคัดหลั่ง



ร่วมบ้าน หรือพักค้างคืน



พูดคุย ใกล้ชิด โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย



นั่งรถคันเดียวกัน



ใช้เสื้อผ้า หรือสิ่งของร่วมกัน

✓ สังเกตอาการ
ภายหลังสัมผัสผู้ป่วยภายใน 21 วัน



ไข้



ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ




ต่อมน้ำเหลืองโต บริเวณหลังหู คอ ขาหนีบ



เจ็บคอ คัดจมูก ไอ

หรือมีผื่น ตุ่มขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก ตามมือ เท้า หน้าอก ในหน้า หรือบริเวณปาก

ตัวอย่างผื่น ตุ่มฝีดาษวานร




http://www.hpa.org.uk/health-professionals/clinical-reference/monkeypox/clinical

หากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์
ณ ศูนย์แพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ สปคม.

โรคฝีดาษวานร/ฝีดาษลิง


Monkeypox คืออะไร?






คือ

โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis Diseases) ที่เกิดจากเชื้อไวรัส
กลุ่ม Orthopoxvirus ซึ่งเป็นสกุลเดียวกันกับเชื้อไวรัสโรคฝีดาษ



Orthopoxvirus



มี 2 สายพันธุ์

- สายพันธุ์ West African clade
  อาการไม่รุนแรง อัตราป่วยเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 1
- สายพันธุ์ Central African clade
  อาการรุนแรงกว่า อัตราป่วยเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 10

สัตว์รังโรค

ยังไม่มีความรู้ที่แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเป็น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
เช่น หนู กระต่าย ลิง




การติดต่อ




จากสัตว์สู่คน

โดยการ[illegible]
หรือ[illegible]




จากคนสู่คน


โดยการ[illegible]
หรือสัมผัสสิ่งของที่เปื้อนเชื้อโรคหลัง
ของผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า



มีการตั้งสมมุติฐานว่า

โรคฝีดาษลิง
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]





a) early vesicle
1mm diameter

b) small pustule
2mm diameter

c) umbilicated pustule
3-4mm diameter





d) ulcerated lesion
1mm diameter

e) crusting of a mature
pustule

f) partially removed
crust

อาการที่สำคัญ

1	2	3	4
ระยะฟักตัว	**ระยะไข้ 1-4 วัน**	**ระยะผื่น 2-4 สัปดาห์**	**ระยะฟื่นตัวหลายวัน**
จะไม่แสดงอาการช่วง 5-21 วัน หลังจากได้รับเชื้อ	มีอาการปวดหัว เจ็บคอ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย	ผื่นจากตุ่มแบน ตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง จนกระทั่งเป็นสะเก็ดแห้งเป็นขุย	จนถึง หลายสัปดาห์



ไข้ 38 องศาขึ้นไป



เจ็บคอ




ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อ





ต่อมน้ำเหลืองโต


มีผื่นกระจายตามลำตัว มีลักษณะเป็นตุ่มนูน
ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มหกสะเก็ด







UNIVERSAL PREVENTION



หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์รังโรค
เช่น กระรอก หนูป่า และลิง



สวมใส่หน้ากากอนามัย
ในที่สาธารณะ



การรักษา



ยาต้านไวรัส cidofovir,
Tecovirimat, brincidofovir

ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้
และพบการเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยสงสัย
หรือยืนยันโรคฝีดาษวานร



หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ



หลีกเลี่ยงการใช้ของ
ร่วมกันกับผู้ป่วย



ป่วยยืนยัน **ควรแยกตนเอง**
เพื่อไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น



<u>ต้องดำเนินการรายงานไปยัง</u>
<u>เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ</u>
<u>ในพื้นที่ เพื่อทำการสอบสวน</u>
<u>โรคและควบคุมโรคโดยเร็ว</u>