

ที่ ยธ ๐๗๐๘.๒/๓๐๗๙

ถึง เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน

ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์ของโรคและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโรคติดต่อที่ถูกกำจัดไปแล้วแต่อาจมีการแพร่ระบาดซ้ำได้อีก ซึ่งพบว่าปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การกลายพันธุ์ของเชื้อโรค การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พฤติกรรม โครงสร้าง รวมทั้งการเคลื่อนย้ายประชากร ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือกับโรคดังกล่าว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประสานงานโรงพยาบาลปฐมภูมิที่รับผิดชอบในพื้นที่ ขอความอนุเคราะห์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ผู้ต้องขัง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ต้องขังในเรือนจำ (เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์) ขอรับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุตามสิทธิการรักษาที่พึงได้รับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (คำแนะนำ การรับวัคซีนของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏดังเอกสารแนบ)

๒. กรมราชทัณฑ์ ได้ประสานงานกรมควบคุมโรคได้รับแจ้งว่า หากโรงพยาบาลใดที่ขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ๐๒-๕๙๐-๓๓๖๕,๐๒-๕๙๐-๓๒๒๒ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๔๒

๓. ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ ขอรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก และจัดบริการดังกล่าวให้ครอบคลุมในกลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ โดยจากข้อมูลกรมควบคุมโรค พบว่าโรคคอตีบเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย โครินแบคทีเรียม ดิปทีเรียอิ โรคนี้ป่วยได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ ผู้เสี่ยงคือผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแออัด สุขอนามัยไม่ดี และผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เชื้ออยู่ในโพรงจมูก หลังโพรงจมูก ลำคอ ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วในกลุ่มคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน จากการคลุกคลีผู้ป่วย การสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ละอองหายใจ การไอจามรดกัน ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคคอตีบดังกล่าวมีประโยชน์ทั้งในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเพื่อควบคุมการระบาด พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่การครอบคลุมวัคซีนต่ำ หรือมีแรงงานย้ายถิ่นจากเพื่อนบ้านและพบได้ตลอดทั้งปีไม่มีฤดูกาล



กองบริการทางการแพทย์
โทร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๕๗

ช่วงอายุ	วัคซีนป้องกันโรคที่แนะนำให้ฉีด	หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ช่วงต้น (อายุ ๑๘-๒๖ ปี)	วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนเอชพีวี วัคซีนตับอักเสบบี	- ฉีดกระตุ้นทุก ๑๐ ปี - ฉีดกระตุ้นทุก ๑ ปี - ฉีด ๑ เข็ม - ควรฉีดตั้งแต่วัยรุ่นต้อนต้น (การฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก) - ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
ผู้ใหญ่ (อายุ ๒๗-๖๕ ปี)	วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบบี	- ฉีดกระตุ้นทุก ๑๐ ปี - ฉีดกระตุ้นทุก ๑ ปี - ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า ๖๕ปี)	วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส	- ฉีดกระตุ้นทุก ๑๐ ปี - ฉีดกระตุ้นทุก ๑ ปี
ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ไม่มีม้าม หัวใจวาย ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง ตับวาย ติดเชื้อเอดส์ รับยากด ภูมิคุ้มกัน)	วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส	- ฉีดกระตุ้นทุก ๑ ปี - ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน