
บทบาทเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับงานพยาบาลในเรือนจำ







หน้าที่ ความรับผิดชอบ

- การควบคุมผู้ต้องขัง
- แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อ “คืนคนดีทั้งกายและจิตสู่สังคม”
- การส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ต้องขัง
  - กาย : ออกกำลังกาย ฝึกวินัย
  - จิต : สอนด้วยตัวเอง บุคคลภายนอก ศาสนา
- ควบคุม ป้องกันโรค : คัดกรองโรค เฝ้าระวังโรค ประสานงานกับสถานพยาบาล ส่งผู้ต้องขังป่วย

ภาระงานประจำวัน กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง





สถานที่นอน เลี้ยงอาหาร โรงครัว สถานพยาบาล ขยะ ส้วม

การพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง

มาตรฐานที่ 1 ที่นอน

- พื้น ผนัง เพดาน สะอาด แข็งแรง สภาพดี ไม่ชำรุด
- เครื่องนอนเพียงพอ(ครบ) สะอาด ไม่เหม็นอับ และควรมีลักษณะเดียวกัน
- การระบายอากาศดี
- มีอุปกรณ์ช่วยระบายอากาศ คือ พัดลมระบายความร้อน
- มีแสงสว่างเพียงพอ
- มีส้วมในเรือนนอนที่สะอาด
- มีจุดน้ำดื่มสำรองทุกห้อง



มาตรฐานที่ 2 สูทกรรม

- สะอาด พื้นที่ทำด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี
- ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น
- โต๊ะเตรียม-ปรุงอาหาร และบริเวณผนังเตาไฟต้องทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
- อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี



มาตรฐานด้านที่ 3 โรงเลี้ยง

- มีโรงเลี้ยงอาหารเป็นสัดส่วน โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ เพียงพอกับจำนวนผู้ต้องขัง (ไม่นั่งรับประทานอาหารที่พื้น) มีอุปกรณ์จัดเลี้ยงครบตามจำนวนผู้ต้องขัง
- มีจุดน้ำดื่มเป็นก๊อกปิด-เปิด หรือใส่ภาชนะที่สะอาด
- มีอุปกรณ์ปกปิดอาหารปรุงเสร็จที่เตรียมเลี้ยง เช่น ฝาชี







มาตรฐานด้านที่ 4 สถานพยาบาล

- สถานที่เหมาะสมและสะดวกต่อการให้บริการ
- ใช้สถานพยาบาลตรงตามวัตถุประสงค์
- มีแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านอนามัยเรือนจำ
- มีเวชภัณฑ์ตามบัญชียาพื้นฐานและ มีการจัดทำสมุดควบคุมบัญชียาที่ถูกต้องไว้ประจำสถานพยาบาล



มาตรฐานด้านที่ 5 กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

- ถังขยะมีสภาพดี ไม่ชำรุด มีฝาปิด แยกประเภทขยะ ขยะเปียก ขยะแห้ง บริเวณที่พักขยะ
- ไม่พบเศษขยะ เช่น ถุงพลาสติก ก้นบุหรี่ ฯลฯ ตามบริเวณทั่วไป
- การกำจัดมูลสัตว์ถูกต้อง
- มีระบบเก็บกักอุจจาระไม่ชำรุด มีท่อระบายอากาศ
- ไม่มีการปล่อยหรือตักอุจจาระหรือน้ำจากบ่อเกรอะ สู่ภายนอกโดยตรง
- สถานที่ตั้งส้วมห่างจากแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ (บ่อน้ำดื่ม บ่อบาดาล ฯลฯ) มากกว่า 30 เมตร


บ่อพักขยะ


คัดแยกขยะก่อนเผา
ถังขยะเปียก
ถังขยะแห้ง




02-03-2007

การควบคุม ป้องกันโรค



โรคที่พบบ่อย

: เอดส์ / วัณโรค / วัณโรคดื้อยา

โรคติดต่ออื่นๆ





บทบาทเจ้าหน้าที่ กับความเสี่ยงต่อการป่วย

- การค้นหาผู้ต้องขังป่วยรายใหม่
  - ผู้ต้องขังแรกรับ/รับย้าย
  - ผู้ต้องขังในแดน

  อาการน่าสงสัย : ไอ > 3 สัปดาห์ ไข้ น้ำหนักลด เหงื่อออกเวลากลางคืน  .....?????
- การส่งต่อสถานพยาบาล
- การควบคุมผู้ต้องขังป่วยไปโรงพยาบาล
- การจู่โจมตรวจค้น

งานที่เกี่ยวข้อง



X-ray 100% ในเรือนจำทั่วประเทศ

ปี 2539 – 2559 สถิติผู้ต้องขังป่วย

วัณโรค 1800 – 2000 ราย

2560 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพิ่ม

จาก X-ray 2473 ราย เมื่อ

รวมผู้ป่วยเก่าที่กำลังรักษา

1500+ ราย = 3973 ราย

2561 กค.ที่ผ่านมา X-ray 37 รจ.

พบผู้ป่วย เพิ่มอีก 547 ราย





HIV / Aids ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลือด ⟹ การใช้เข็มร่วมกัน

การค้นหาผู้ป่วยเอดส์ : การตรวจเลือด

เพื่อหาเชื้อเอช ไอ วี

จากข้อมูลปี 2559 -2561

พบผู้ต้องขังติดเชื้อ HIV/ Aids

ประมาณ 2,737 ➡ 3,567 ➡ 4,229

ผู้ต้องขัง 91 % ได้รับยา ARV





โรคระบาดภายนอกเรือนจำ ส่งผลต่อภายในเรือนจำ การติดต่อ

- เยี่ยมญาติ ??
- ผู้ต้องขังป่วย ขาดการแยกป่วย คัดกรองช้า ??
- กิจกรรมอื่นๆ เช่น ย้ายระบาย ร่วมกิจกรรมภายนอกเรือนจำ

บทบาทเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

1. เฝ้าระวังผู้ต้องขังมีอาการสงสัย เช่น ไข้ ไอ > 2 สัปดาห์
2. แจ้งสถานพยาบาล / นำผู้ต้องขังอาการสงสัยส่งพบแพทย์
3. ผู้ต้องขังป่วยจำนวนมาก และไม่สามารถแยกไว้ที่สถานพยาบาลได้หมด จัดหาห้องแยกในเรือนนอนเป็นการเฉพาะ โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่ดี แสงแดดส่องถึง
4. รายงานสถานการณ์โดยด่วนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ร่วมกับพยาบาลเรือนจำ
5. ให้ความร่วมมือกับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขภายนอก (ร.พ สสอ. สสจ. สคร.) ที่เข้ามาดำเนินการสอบสวนโรค โดยให้ถือปฏิบัติตามแผนการรักษาและข้อแนะนำในการควบคุมสถานการณ์โรคอย่างเคร่งครัด

งานที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2562

1. การคัดกรองผู้ต้องขังป่วยวัณโรค และโรคเอดส์ ในเรือนจำ ทั่วประเทศ

   - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำ ดำเนินการคัดกรองหาผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี

   - ค้นหาผู้ต้องขังป่วยวัณโรคด้วยวิธี X-ray 100%

   - การรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยการ X-ray ปอดในผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี หากผล Film ปกติ ทดสอบ TST (Tuberculin skin Test) ถ้าผลปกติ ไม่ให้ยา (INH) แต่ติดตามทุก 1 ปี ถ้าผลผิดปกติจะให้ INH 9 เดือน



ขอบคุณค่ะ