

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

(ฉบับปรับปรุง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)



มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

(ฉบับปรับปรุง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)



มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(ฉบับปรับปรุง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

๑. แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

๑.๑ <u>การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u>

๑) ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคน ด้วยวิธีตรวจแอนติเจน(ATK) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือทุก ๗ วัน

๒) ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๑.๒ <u>ผู้สัมผัสใกล้ชิด</u> แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

๑.๒.๑ <u>ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง</u> หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฯ และไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน PPE ตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัส รวมถึง ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือได้รับเข็มสุดท้ายเกินกำหนดระยะเวลาการได้รับเข็มกระตุ้น

- อยู่ใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในระยะ ๒ เมตร เป็นเวลานานกว่า ๕ นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย

- อยู่ในพื้นที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ ร่วมกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ เป็นระยะเวลานานกว่า ๓๐ นาที เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ

๑) ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา **<u>๑๐ วัน โดยไม่กักตัว</u>** และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอื่น ปฏิบัติตามหลัก DMHT อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และประเมินอุณหภูมิร่างกาย เช้า – เย็นและเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ

๒) ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ โดยนับจากวันสัมผัสครั้งสุดท้าย ใน Day ๕ หรือเมื่อมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ATK)

- กรณี <u>ผลบวก</u> รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

- กรณี <u>ผลลบ</u> ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑) จนครบ ๑๐ วัน

๓) กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรง เช่น กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง สูงอายุ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ประเมินอุณหภูมิร่างกาย เช้า – เย็นและเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ

๔) ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๕) เมื่อครบ ๑๐ วัน สามารถกลับมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตามปกติ (ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ซ้ำ)

๑.๒.๒ <u>ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ</u> หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือสัมผัสผู้ป่วยแต่ไม่เข้าข่ายตามข้อ ๑.๒.๑

๑) สังเกตอาการตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด และ**<u>ไม่ต้องกักตัว</u>**

๒) ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

/ ๑.๓ **<u>ผู้ป่วย</u>** ...

๑.๓ <u>ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u> ทั้งที่แสดงและไม่แสดงอาการป่วยของโรคฯ

๑) ให้<u>กักตัว</u>เพื่อรักษาอาการเป็นเวลา ๕ วัน รับการรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ และอีก ๕ วัน สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอื่น ปฏิบัติตามหลัก DMHT อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

๒) เมื่อครบ ๑๐ วัน สามารถกลับมาทำงานตามหน้าที่ได้ตามปกติ (ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ซ้ำ)

๒. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ต้องขัง

๒.๑ <u>ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย</u>

๑) สำรวจประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้ายทุกราย ในรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนฯ ครบระยะเวลาต้องได้รับเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว ให้รีบดำเนินการตามแนวทางการให้วัคซีนฯ ของกระทรวงสาธารณสุข

๒) สำรวจประวัติว่าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงหรือไม่ เช่น ครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประวัติโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง/กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ โดยให้แยกตัวออกจากผู้ต้องขังเข้าใหม่รายอื่นเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

๓) แยกกักตัว <u>๕</u> วัน ในห้องแยกกักโรค โดยกำหนดจำนวนผู้ต้องขังในห้องแยกกักโรคแต่ละห้องให้ได้จำนวนน้อยที่สุด เช่น ห้องละ ๕-๑๐ คน และเมื่อผู้ต้องขังเข้าห้องกักครบตามจำนวนแล้วให้ปิดห้อง ไม่รับผู้ต้องขังเพิ่ม (นับเป็น Day ๐) หากมีการเพิ่มจำนวนผู้ต้องขังในห้องดังกล่าว ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

๔) ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในผู้ต้องรับใหม่/รับย้าย ด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ATK) ใน **Day ๕ หรือวันสุดท้ายก่อนออกจากห้องแยกกักโรค**

- กรณี <u>ผลบวก</u> แยกกัก หรือเข้าสู่ระบบการรักษาใน CI หรือโรงพยาบาลสนามเรือนจำ ผู้ต้องขังรายอื่นที่ผลเป็น <u>ลบ</u> ให้เริ่มนับ Day ๑ ใหม่ หากมีอาการอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI) <u>**ให้ทำการตรวจทันที**</u>

- กรณี <u>ผลลบ</u> ทุกครั้ง ทั้งห้อง ให้ส่งตัวไปกักต่อยังพื้นที่กันชน (Buffer Zone)

๕) กรณีที่มีห้องแยกกักโรคเพียงพอ ควรแยกกักผู้ต้องขังเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง โดยแยกออกจากกลุ่มผู้ต้องขังรับใหม่ทั่วไป เพื่อติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

๖) แนะนำให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมหน้ากากอนามัย (Mask) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่างๆ ร่วมกัน

๗) ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

/ ๘) ระหว่าง ...

๘) ระหว่างการแยกกักตัวในห้องแยกกักโรค ให้ผู้ต้องขังทำกิจกรรมเฉพาะภายในห้อง งดการทำกิจกรรมข้ามห้อง งดการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนห้อง

๙) ผู้ต้องขังที่ผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ เป็นลบทุกครั้ง และกักตัวครบ ๕ วัน ให้ส่งไปยังพื้นที่กันชน (Buffer Zone) โดยระยะเวลาในพื้นที่กันชน (Buffer Zone) **๕** วัน โดยกำหนดให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เหลื่อมเวลากับผู้ต้องขังอื่นในเรือนจำ ไม่ให้ปะปนกัน

๑๐) เมื่อครบ **๕** วันในพื้นที่กันชน (Buffer Zone) หากไม่มีอาการหรืออาการแสดงของการป่วย COVID-19 สามารถส่งเข้าแดนปกติได้ กรณีมีอาการ PUI (Patient under investigation) ให้ตรวจ ATK ทันที

๒.๒ <u>ผู้ต้องขังกลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล</u> แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้ต้องขังกลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล กรณี **<u>ไป-กลับ ภายในวันเดียว</u>**

๑) แยกกักตัว ๕ วัน ในพื้นที่กันชน (Buffer Zone) โดยกำหนดจำนวนผู้ต้องขังในห้องแต่ละห้องให้ได้จำนวนน้อยที่สุด ถ้ามีพื้นที่เพียงพอให้จัดแยกออกจากผู้ต้องขังกักตัวอื่น และไม่ให้เพิ่มผู้ต้องขังเข้าไปภายหลังปิดห้อง โดยกำหนดให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เหลื่อมเวลากับผู้ต้องขังอื่น หากมีการเพิ่มจำนวนผู้ต้องขังในห้อง ให้เริ่มนับ Day ๑ ใหม่

๒) ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๓) แนะนำให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย (Mask) ขณะอยู่ภายนอกเรือนจำ และให้งดรับประทานอาหารร่วมกัน หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่างๆ ร่วมกัน

๔) เมื่อกักตัวครบ ๕ วัน ตามมาตรการฯ หากไม่มีอาการ PUI ให้ส่งตัวไปยังแดนปกติได้ **<u>ยกเว้น</u>** กลุ่ม,ปราะบาง ๖๐๘ กลุ่มผู้สูงอายุ ก่อนส่งตัวลงแดนปกติ ให้ตรวจหาเชื้อฯ ด้วย ATK

๒.๒.๒ ผู้ต้องขังกลับจากโรงพยาบาล กรณี **<u>นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล</u>**

๑) แยกกักตัว ๕ วัน ในพื้นที่กันชน โดยจัดพื้นที่เฉพาะแยกออกจากผู้ต้องขังกักตัวอื่น ไม่ให้ปะปนกัน

๒) ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ATK) ใน **Day ๕**

๓) ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๔) แนะนำให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมหน้ากากอนามัย (Mask) ควรหมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่างๆ ร่วมกัน

๕) เมื่อกักตัวครบ ๕ วัน ตามมาตรการฯ หากไม่มีอาการ PUI ให้ส่งตัวไปยังแดนปกติได้

๒.๓ <u>ผู้ต้องขังเก่าในเรือนจำ</u>

- ผู้ต้องขังทั่วไป ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

- ผู้ต้องขังกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ ให้เฝ้าระวังและตรวจคัดกรองอาการอย่างใกล้ชิด

/ กรณี ...

กรณี เรือนจำที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ดำเนินการดังนี้

๑) กลุ่มผู้ต้องขังเข้าข่าย/ยืนยันติดเชื้อฯ แยกกักตัวใน CI/โรงพยาบาลสนามเรือนจำ และเข้าสู่ระบบการรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายและสาธารณสุขในพื้นที่

๒) กลุ่มผู้ต้องขังเสี่ยงสูง

- แยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กลุ่มผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ และ กลุ่มทั่วไป โดยทั้งสองกลุ่มควรจัดพื้นที่แยกกัก ไม่ให้ปะปนกัน

- แยกกักตัวในพื้นที่กักโรค เป็นเวลา ๑๐ วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันสัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยันติดเชื้อฯ ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ ๑ (day ๑) โดย

- **กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง** ประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กลุ่มผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ จัดพื้นที่แยกกักเฉพาะ เพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ประเมินอุณหภูมิร่างกาย เช้า – เย็น เฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ และตรวจหาเชื้อฯ ทันทีเมื่อมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI) และสุ่มตรวจร้อยละ ๕ – ๑๐ ในวันที่ ๕ (day ๕)

- **กลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง** เช่น ผู้ต้องขังทั่วไป ประเมินอุณหภูมิร่างกาย เช้า – เย็นและเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ตรวจหาเชื้อฯ ทันที เมื่อมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

กรณี **ผลบวก** แยกกัก หรือเข้าสู่ระบบการรักษาใน CI หรือโรงพยาบาลสนามเรือนจำ ผู้ต้องขังรายอื่นในห้องเดียวกันที่ผลเป็น **ลบ** ให้เริ่มนับ Day ๑ ใหม่ หากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI) **ให้ทำการตรวจทันที**

กรณี **ผลลบ** เมื่อกักตัวครบ ๑๐ วัน สามารถส่งกลับเข้าแดนได้ตามปกติ

๓) กลุ่มผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว แยกกักก่อนปล่อย ๑๐ วัน ตรวจหาเชื้อฯ ทันทีเมื่อมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

- ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ เฉพาะในรายที่มีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ หรือในรายที่มีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI) กรณี **ผลบวก** ให้คำแนะนำรับการรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์/กระทรวงสาธารณสุข

- ออกใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับผู้ต้องขังทุกรายนำติดตัวไป

๔) แนะนำให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมหน้ากากอนามัย (Mask) ควรหมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่างๆ ร่วมกัน

อ้างอิงจาก :

๑. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒๒ ฉบับปรับปรุง ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒๓ ฉบับปรับปรุง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

/ ๓. นิยาม ...

๓. นิยามและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

๔. นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. แนวทางการให้วัคซีนโควิด ๑๙ ในสถานการณ์การระบาดปี ๖๔ ของประเทศไทย.กรมควบคุมโรค.

๖. นิยามการเฝ้าระวังโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Ccronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID -19) กรมควบคุมโรค ฉบับ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗ . CDC, Guidance on Prevention and Management of Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-19) in Correctional and Detention Facilities, Updated May ๓, ๒๐๒๒

๘. นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๙.คำแนะนำการเฝ้าระวังควบคุมโรค (COVID-19) ในเรือนจำ กรมควบคุมโรค ข้อมูลล่าสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕