
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คือ กลุ่มโรคต่างๆที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอด ทางปาก หรือทวารหนัก กับผู้ที่กำลังมีเชื้อ


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หิด
แผลริมอ่อน
กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง
แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ
เริม
หนองใน
หนองในเทียม
หูดหงอนไก่
หูดข้าวสุก
พยาธิช่องคลอด
เชื้อราช่องคลอด
กลากหรือสังคัง
โลน

ซิฟิลิส

- สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- ระยะฟักตัว 9 – 90 วัน
- การติดต่อ 1.ทางเพศสัมพันธ์
- 2.แม่สู่ลูกในครรภ์






- อาการ มีแผลที่อวัยวะเพศไม่เจ็บแผลหายเองได้ มีผื่นขึ้นตามตัว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ไม่เจ็บไม่คัน ผมร่วง คิ้วร่วงหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาโรคจะลุกลามทำลายอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย เช่น หัวใจ หลอดเลือด สมอง กระดูก ทำให้พิการได้

<u>ระยะที่หนึ่ง</u> แผลที่อวัยวะเพศจาก ซิฟิลิส

- จะเกิดขึ้นใน 3 สัปดาห์หลังติดเชื้อ





<u>ระยะที่สอง</u> ออกผื่น

หลังแผลในระยะแรกประมาณ 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน

ผื่นที่ลำตัว




ผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้า



- ผื่นที่อวัยวะเพศ



ผื่นในช่องปาก



ผมร่วงจากซิฟิลิส

ลักษณะผมร่วงเป็นหย่อมเหมือนมอดแทะ



ระยะสาม

-อาการปวดกระดูกและแผลจากเชื้อ ซิฟิลิส

-อาการทางระบบประสาท เสียการมองเห็น การได้ยิน อารมณ์ผิดกติ สมองเสื่อม



หนองใน

- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **ระยะฟักตัว** 3 – 5 วัน
- **การติดต่อ** ทางเพศสัมพันธ์





- **อาการ** ในผู้ชาย ปัสสาวะแสบขัดมีหนองไหลทางท่อปัสสาวะ บางรายต่อมลูกหมากโตท่อปัสสาวะตีบตันเป็นหมัน ในผู้หญิง มีตกขาวกลิ่นเหม็นไม่คัน ปากมดลูก ท่อปัสสาวะอักเสบบางรายท่อรังไข่ตีบตัน เป็นหมัน


MALE
FEMALE



หนองในเทียม

- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อหลายชนิดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **ระยะฟักตัว** 1 – 4 สัปดาห์
- **การติดต่อ** ทางเพศสัมพันธ์





- **อาการ** ในผู้ชาย ปัสสาวะขัด มีมูกข้น(ไม่ใช่หนอง)ไหล โดยเฉพาะตอนเช้าในผู้หญิง ส่วนมากมักไม่มีอาการส่วนน้อยอาจมีตกขาว

แผลริมอ่อน

- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **ระยะฟักตัว** 4 – 7 วัน
- **การติดต่อ** ทางเพศสัมพันธ์



- **อาการ** ในผู้ชาย มีตุ่มหนองที่อวัยวะเพศ ต่อมาแตกเป็นแผลมีหลายแผลขอบไม่แข็ง ไม่เรียบ มีเลือดออก เจ็บปวดมาก ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโตในผู้หญิง อาการโดยทั่วไปเหมือนผู้ชาย มีตกขาว เจ็บขณะร่วมเพศ





กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง



- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **ระยะฟักตัว** 3 – 30 วัน
- **การติดต่อ** ทางเพศสัมพันธ์
- **อาการ** มีตุ่มหรือแผลตื้นๆที่อวัยวะเพศและหายเอง ภายใน 2 – 3 วัน ต่อมาต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบจะอักเสบ บวม แดง ร้อน บางรายแตกมีหนองไหลกลายเป็นแผล เรื้อรัง ลุกลาม จนทำให้ทวารหนักอักเสบอุจจาระไม่ออก

ตุ่มนี้มักไม่เจ็บ แตกเป็นแผลและหายไปเอง
ระยะนี้ผู้ป่วยจึงมักไม่สังเกตเห็น



ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต





แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ



- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- **ระยะฟักตัว** 2 สัปดาห์ – 6 เดือน
- **การติดต่อ** ทางเพศสัมพันธ์
- **อาการ** เป็นแผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศขาหนีบ ซอกขา หน้า คอ ปาก

เริม

- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อไวรัส
- **ระยะฟักตัว** 4 – 7 วัน
- **การติดต่อ** การร่วมเพศ





สัมผัสทางเพศเช่นทารกที่เกิดผ่านทางช่องคลอดมารดา

- **อาการ** มีตุ่มน้ำใสเป็นกลุ่ม คันต่อมาแตกเป็นสะเก็ด หายเองภายใน 1 – 2สัปดาห์ บริเวณที่พบบ่อย ริมฝีปากอวัยวะเพศชาย ช่องคลอด ปากมดลูกทวารหนัก เยื่อบุตา ท่อปัสสาวะ









หูดหงอนไก่





- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อไวรัส
- **ระยะฟักตัว** 1 – 6 เดือน
- **การติดต่อ** ทางการร่วมเพศและ สัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย
- **อาการ** เป็นติ่งเนื้ออ่อนสีชมพูคล้ายหงอนไก่ ชอบขึ้นตรงบริเวณที่อับชื้นและอุ่น เช่น อัณฑะใต้หนังหุ้มท่อปลาย ปัสสาวะ ปากช่องคลอด ปากมดลูก ทวารหนัก ฝีเย็บ









หูดข้าวสุก





- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อไวรัส
- **ระยะฟักตัว** 1สัปดาห์ – 6 เดือน
- **การติดต่อ** สัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย
- สัมผัสทางผิวหนังกับผู้ป่วย
- **อาการ** เป็นตุ่ม ผิวเรียบ ขนาดเล็ก มีสีขาวตรงกลางตุ่ม มีรอยบุ๋ม ในเด็ก มักเกิดขึ้นตามลำตัว แขน ขา ในผู้ใหญ่ มักเกิดขึ้นตาม ท้องน้อย หัวหน่าว อวัยวะเพศและโคนขาด้านใน

เป็นตุ่มขาวขุ่นมีรอยบุ๋มตรงกลางคล้ายสะดือ





พยาธิช่องคลอด






- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อโปรตัวซัว
- **ระยะฟักตัว** 1 – 6 เดือน
- **การติดต่อ** โดยการร่วมเพศและสัมผัส ทางเพศกับผู้ป่วย
- **อาการ** ในผู้ชาย มีของเหลวเป็นเมือกใสหรือเมือกปนหนองไหลออกมา คันเจ็บในท่อปัสสาวะในผู้หญิง มีตกขาวกลิ่นเหม็น คัน แสบปากช่องคลอด เจ็บปวดเวลาร่วมเพศ

เชื้อราช่องคลอด

- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อรา
- **การติดต่อ** จากการสัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย
- **อาการ** ในผู้หญิง คัน ปวดแสบปวดร้อนปัสสาวะขัด เจ็บช่องคลอดขณะร่วมเพศ มีตกขาวใสหรือขาวข้น เป็นหนอง ปากช่องคลอดสีแดงจัด ในผู้ชาย คันปวดแสบปวดร้อน เจ็บที่อวัยวะเพศมีเมือกสีขาว หนองไหลทางท่อปัสสาวะ





กลากหรือสังคัง


- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อรา
- **การติดต่อ** สัมผัสทางเพศหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
- **อาการ** มีตุ่มแดงที่ต้นขาหรือขาหนีบ หัวหน่าว ถุงอัณฑะ รอบทวารหนักจากนั้นกลายเป็นวงมีขอบชัดเจน คัน





โลน

- **สาเหตุ** เกิดจากเชื้อโลน
- **ระยะฟักตัว** 1 เดือน






- **การติดต่อ** สัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย
- **อาการ** คันบริเวณหัวหน่าว รอบทวารหนัก หน้าอก
- ลำตัว รักแร้ ขนตา คิ้ว



หิด






- **สาเหตุ** จากตัวไรชนิดหนึ่ง
- **ระยะฟักตัว** 2 – 6 สัปดาห์
- **การติดต่อ** สัมผัสกับผู้ป่วย
- **อาการ** มีตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง คัน มักพบตามง่ามมือง่ามเท้า ก้น อวัยวะเพศ คันมากในตอนกลางคืน




ผื่นที่อวัยวะเพศ



ผื่นที่ผ่าเท้า





ที่ผ่ามือจะเป็นตุ่มแดงๆ คัน

การป้องกัน....ไม่ให้ติดโรค

- 1.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยา/สามี
- 2.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น
- 3.รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ



ควรปฏิบัติตนอย่างไรขณะป่วยและรักษา



- 1.งดร่วมเพศโดยเด็ดขาด
- 2.งดของมึนเมาทุกชนิด เช่น เหล้า - เบียร์
- 3.นำคู่นอนไปตรวจและรักษาด้วยโดยเร็ว
- 4.รักษาอวัยวะเพศให้สะอาดและแห้ง
- 5.ในผู้ชาย ห้ามรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองเป็นอันขาด ให้กลั้น
- ปัสสาวะอย่าง น้อย 4 – 6 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจโรค
- 6.ห้ามซื้อยากินเอง
- 7.ไปพบหมอตามนัดทุกครั้ง

ขอบคุณ

